

[illegible]

Huidinfecties

Maag/darminfecties

Persisterende of recid. maagklachten *Helicobacter pylori*

klachtenduur > 2 tot 3 maanden of recidief < 1 jaar na eerste episode
met positieve uitslag voor *Helicobacter pylori*

1. Tripletherapie: amoxicilline 2dd 1000mg + claritromycine 2dd500mg tab. + protonpompremmer (PPI) (esomeprazol 2 dd 20mg, bij ouderen: pantoprazol 2 dd 40 mg) ged. 10 dagen.

2. Bij **overgevoeligheid** penicilline: metronidazol 2dd500mg tab. + claritromycine 2dd500mg tab. ged. 10 dagen + protonpompremmer (zie punt 1).

Continueer na eradicationbehandeling PPI 4 wkn en probeer daarna af te bouwen.

Controleer na elke eradicationkuur op eradication

Acute diarree bij volwassenen*Campylobacter*-soorten, *Salmonella*-, *Shigella*-, en *Yersinia*-soorten, *E. coli*

zowel bij onbekende als bekende verwekker aléén bij ernstig algheele ziekte zijn of immuun-gecompromitteerd of bij *Salmonella* met kunstmateriaal in situ, ***ná* anaëroefeceskweek.**

1. Bij onbekende verwekker: azitromycine 1dd500mg tab. ged. 3dgn

2. Verder op geleide van de kweek

3. Bij bekende verwekker:

- *Campylobacter*: azitromycine 1dd500mg tab. ged. 3dgn
- *Salmonella* (non-typhi): ciprofloxacine 2dd500mg tab. (**1e keus**) of cotrimoxazol 2dd960mg tab. ged. 1wk.
- Bij **immuungecompromitteerden**, **of kunstmateriaal in situ** ged. **2wkn**
- *Shigella*: ciprofloxacine éénmalig 2 tab. à 500mg (**1e keus**) of azitromycine 1dd500mg tab. of cotrimoxazol 2dd960mg tab. ged. 3dgn.
- Bij immuungecomprom. ciprofloxacine 2dd500mg tab. ged. 7-10dgn
- *Yersinia*: ciprofloxacine 2dd500mg tab. (**1e keus**) of cotrimoxazol 2dd960mg tab. ged. 5dgn
- ***Antibiotica en loperamide zijn gecontra-indiceerd bij enterohemorragische E. coli (EHEC), ook wel shigatoxine producerende E. coli genoemd, omdat zij niet effectief zijn.***

Reizigersdiarree *Escherichia coli*, *Campylobacter*, *Salmonella*, *Shigella*, *Yersinia*

alléén in landen met sterk verhoogd risico op ernstige diarree of bij reizigers onder primitieve omstandigheden met belangrijke comorbiditeit

Tijdens reis:

Zelfbehandeling met ciprofloxacine 2dd 500mg tab. ged. 3 dgn of éénmalig 2 tab. à 500mg.

Voor reizen naar Azië: azitromycine 1dd 500 mg tab. ged. 3 dgn (vanwege hoge resistentie

van *Campylobacter* tegen fluorochinolonen). Overweeg dit mee te geven aan mensen die een reis gaan maken naar een land met een sterk verhoogd risico op ernstiger vormen van diarree (Zuid- en Midden-Amerika, Afrika, Midden-Oosten, Azië).

Let op: niet altijd zijn antibiotica geïndiceerd!
 Voorlichting, adviezen en andere medicamenteuze therapie zijn niet in dit zakkaartje verwerkt.

Volg altijd het protocol van jouw instelling
We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor wijzigingen en eventuele (druk)fouten

Bronnen: NHG, FTK, SWAB
online versie: www.esculaap.nl/antibiotica



Een uitgave van Esculaap - © Copyright - Alle rechten voorbehouden

ANTIBIOTICA DEEL 1

Huidinfecties

ANTIBIOTICA DEEL 1

KNO- en luchtweginfecties

Otitis externa
alleen bij koorts en alg. ziek zijn

stafylokokken (meest voorkomend: *Staphylococcus epidermidis*),
Pseudomonas aeruginosa, *Streptococcus pyogenes*

ESCU LAAP

1. Flucloxacilline 3dd500mg caps. ged. 1wk
2. Bij **overgevoeligheid**: macrolide (azitromycine 1dd500mg tab. ged. 3 dgn of claritromycine 2dd250mg tab. ged. 1wk)

Otitis media acuta (OMA) *Streptococcus pneumoniae, H. influenzae, Moraxella catarrhalis*
alleen bij alg. ziek zijn, risicogroepen of otorroe > 1 wk bij spontane trommelvliesoperatie

1. amoxicilline 40mg/kg/dag in 3 giften. ged. 1wk
2. Bij **overgevoeligheid**: cotrimoxazol 36mg/kg/dag in 2 giften ged. 5-7 dgn.
3. Bij onvoldoende verbetering na 2dgn:
amoxicilline/clavulaanzuur 40/10mg/kg/dag in 3 giften ged. 1wk. of verwijst.

Acute (rhino)sinusitis *Streptococcus pneumoniae, H. influenzae, Moraxella catarrhalis, Staph. aureus*
alléen bij ernstig ziek zijn of evt. bij koorts > 5dgn of verminderde weerstand

1. Amoxicilline 3dd500mg caps. ged. 1wk
2. Bij **overgevoeligheid** of onvoldoende verbetering na 2dgn: doxycycline 1e dag 200 mg, gevolgd door 1dd100mg disp.tab. ged. 1wk
bij **zw.schap/lactatie** cotrimoxazol 2dd960mg tab. ged. 1wk
bij **kinderen < 8 jr** cotrimoxazol 36mg/kg/dag in 2 giften, max. 1920mg/dag

Acute keelpijn (faryngotonsillitis) met ernstige alg. ziek zijn of risico op complicaties	Groep A bèta-hemolytische streptokok
---	--------------------------------------

1. feneticilline 3dd500mg caps. ged. 1wk
2. Bij onvoldoende verbetering na 2dgn:
amoxicilline/clavulaanzuur 3dd625mg ged. 1wk
3. Bij **overgevoelicheid**: macrolide (zie **otitis externa**)

Peritonsillair infiltraat en lymfadenitis colli	Stafylokok of streptokok
---	--------------------------

1. amoxicilline/clavulaanzuur 3dd 500/125mg ged. 1wk
Kinderen: 40/10mg/kg/daq in 3 qiften, max. 1500/375mg ged. 1 wk

Gecompileerde LWI *Streptococcus pneumoniae, H. influenzae, Mycoplasma pneumoniae*

- acute bronchitis met ernst. alg. ziek zijn
- pneumonie
- infectieverschijnselen bij COPD
- (aspiratie)pneumonie

1. amoxicilline 3dd500mg caps. ged. 5dgn.
2. Bij **overgevoeligheid** of onvold. verbetering na 2dgn: doxycycline 1dd100mg disp. tab. (1e dag 2 tab. tegelijk) ged. 1wk. **Kinderen:** azitromycine 10mg/kg/dag in 1 gift, ged. 3 dgn bij **zw.schap/lactatie** erytromycine 4dd500mg ged. 7dgn.
3. Bij verdenking aspiatiepneu: amoxicilline/clavulaanzuur 3dd625mg tab. ged. 1wk
4. Bij verhoogd risico pneumonie door Q-koorts (Coxiella burnetii) of Legionella: doxycycline 2dd 100mg ged. 14-21 dgn.

Kinkhoest	<i>Bordetella (para)pertussis</i>
alléén ter preventie van sec. ziektegevallen bij zuigelingen en hoogzwangeren	

1. azitromycine 1dd500mg tab. ged. 3dgn
bij **zw.schap/lactatie**: erytromycine 4dd500mg tab. ged. 1wk.
2. overweeg profylaxe voor alle gezinsleden.